

Exercice 1 (4,5 points)

Pour chacune des questions suivantes une seule des trois réponses proposées est exacte. Indiquer sur la copie le numéro de la question et la lettre correspondant à la réponse choisie. Aucune justification n'est demandée.

1. Les solutions de l'équation $3x^2 + x - 4 = 0$ sont :

- a) -1 et $-\frac{4}{3}$; b) 1 et $-\frac{4}{3}$; c) 1 et $\frac{4}{3}$

2. Si a et b sont deux réels tels que : $a + b = 1$ et $a.b = -6$ alors a et b sont solutions de l'équation :

- a) $x^2 - x - 6 = 0$; b) $x^2 + x - 6 = 0$; c) $x^2 + x + 6 = 0$

3. Si le signe d'un trinôme du second degré $ax^2 + bx + c$ est donné par le tableau ci-dessous alors :

x	$-\infty$	$-\frac{1}{2}$	1	$+\infty$
$ax^2 + bx + c = 0$		0	0	
	-	+	-	

- a) $a > 0$; b) $c > 0$; c) $\frac{a}{b} = \frac{1}{2}$

EXERCICE 2 (5,5 points)

1. Soit l'équation (E) : $x^2 - 2x\sqrt{5} - 8 = 0$

a) Sans calculer le discriminant, montrer que l'équation (E) admet deux racines distinctes.

b) Sans calculer les racines x' et x'' de l'équation (E), calculer les expressions suivantes:

$$A = (2x' + 1)(2x'' + 1) \quad \text{et} \quad B = x'^2 + x''^2.$$

2. a) Développer et simplifier $(2\sqrt{2} + 1)^2$.

b) Résoudre alors dans \mathbb{R} l'inéquation $x^2 + x - 2 - \sqrt{2} \leq 0$.

EXERCICE 3 (10 points)

L'unité de longueur étant le centimètre.

Soit ABC un triangle rectangle isocèle en A tel que $AB = 4$. On note I le milieu du segment

[AB] et J le point tel que $\overrightarrow{AJ} = \frac{1}{4}\overrightarrow{AC}$.

1. Soit L le point défini par $\overrightarrow{AL} = -\frac{1}{2}\overrightarrow{AC}$.

- a) Montrer que $\overrightarrow{CL} = 2\overrightarrow{CJ}$.
b) Placer le point L sur la figure.

2. On rapporte le plan au repère $\left(A, \frac{1}{2}\overrightarrow{AI}, \overrightarrow{AJ}\right)$.

Déterminer les coordonnées des points A, I, J, B, C et L.

3. Pour tout réel a non nul, on considère le point M de coordonnées $(2 - 2a, a)$.

- a) Montrer que pour tout a réel non nul, les points I, J et M sont alignés.
b) Déterminer la valeur de a pour laquelle les vecteurs \overrightarrow{MI} et \overrightarrow{ML} sont orthogonaux. Placer M pour la valeur de x trouvée.

