

Exercice ①

On considère, dans un repère orthonormé :


- les points $A(-2; -2)$, $B(0; -4)$, $C(3; 5)$ et $D(5; -1)$;
 - la courbe Γ d'équation cartésienne : $x^2 + y^2 - 2x - 2y - 18 = 0$.
- a) Démontrer que la courbe Γ est un cercle dont vous déterminerez les coordonnées de son centre Ω et son rayon r .
 - b) Déterminer des équations paramétriques et une équation cartésienne de la droite d contenant les points A et B .
 - c) Montrer que la droite d est sécante au cercle Γ et rechercher les coordonnées des points d'intersection entre cette droite d et le cercle Γ .
 - d) Montrer que les points C et D appartiennent au cercle Γ .
 - e) Déterminer les coordonnées du point T , point d'intersection entre les tangentes t_1 en C et t_2 en D .
 - f) Calculer les distances $|TC|$ et $|TD|$.
 - g) Quelle est la nature du quadrilatère ΩCTD ? Justifier.

Exercice ②

On considère la fonction $f : x \mapsto \frac{x}{1+x^2}$.

- (1) Quel est le *domaine* de f ?
- (2) Étudier la *parité* de f .
- (3) Exprimer $f(\frac{1}{x})$ en fonction de x . Que constate-t-on ?
- (4) Étudier le sens de variation de f
 - d'abord sur \mathbb{R}_+ en utilisant le *taux de variation*
 - ensuite sur \mathbb{R}_- en utilisant la *symétrie* de la courbe représentative de f .
- (5) Établir le *tableau de variation* de f .
- (6) Faire un *tableau des images* de f et *représenter graphiquement* f dans un repère orthonormé (unité sur (Ox) et sur $(Oy) = 2$ cm). Je tiendrai compte de la précision de votre courbe.

Exercice ③



: En utilisant le graphique suivant, répondre aux questions suivantes :


1. Quel est le domaine de définition \mathcal{D}_f de f ?
2. Donner l'image de 0 par f .
3. Quel est l'ensemble des antécédents de 0 par f ?
4. En justifiant par une phrase, résoudre $f(x) = 1$.
5. En justifiant par une phrase, résoudre $f(x) < 2$.

Exercice 4

Sur la figure ci-dessous :

- $ABCD$ est un carré de côté 10,
- M – mil $[AB]$ et N – mil $[BC]$, de sorte que $[MN] \parallel [AC]$,
- X se déplace sur le segment $[AD]$ à partir de A ; on pose $AX = x$.
- Y se déplace sur le segment $[CD]$ à partir de C avec la même vitesse que X , de sorte que $CY = AX = x$.

Le but de l'exercice est de déterminer la position de X sur le segment $[AD]$ pour que l'aire du trapèze $XMNY$ soit maximale.



- (1) Déterminer l'aire des 4 triangles AMX , BMN , CNY et DXY en fonction de x .
- (2) En déduire l'aire $A(x)$ du trapèze $XMNY$ en fonction de x .
- (3) Déterminer la position de X telle que l'aire $A(x)$ du trapèze soit maximale.