

**Exercice n°1** : (8 pts)

A- on donne sur la figure ci-contre la courbe représentative, dans un repère  $(O, \vec{i}, \vec{j})$ , d'une fonction  $g$  définie sur  $[-1; 2]$  par :  $g(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$ , où  $a$ ,  $b$  et  $c$  sont trois réels.

1) Par lecture graphique, déterminer :

a/  $g([-1; 2])$ .

b/ Le nombre de solutions de chacune des équations :

$g(x) = 0$  et  $g(x) = -1$ .

c/ Les réels  $a$ ,  $b$  et  $c$ .

2) On désigne par  $\alpha$  la solution de l'équation :  $g(x) = 0$ .

Donner un encadrement de  $\alpha$  d'amplitude 0,5.

B- Soit  $f$  la fonction définie sur  $\mathbb{R}$  par :

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x+1}{\sqrt{x^2+3}-2} & \text{si } x < -1 \\ g(x) & \text{si } -1 \leq x \leq 2 \\ \sqrt{x^2-x+2} + mx & \text{si } x > 2 \end{cases} \quad \text{où } m \text{ est un réel.}$$

On désigne par  $C_f$  sa courbe représentative dans un repère orthonormé  $(O, \vec{i}, \vec{j})$ .

1) Montrer que  $f$  est continue en  $(-1)$ .

2) Déterminer le réel  $m$  pour que  $f$  soit continue en 2.

Dans la suite de l'exercice, on pose  $m = -\frac{1}{2}$ .


3) Calculer  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ . Interpréter géométriquement le résultat.

4) Montrer que  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ .

5) a/ Montrer que, pour tout  $x > 0$ . On a :  $\sqrt{x^2 - x + 2} - x = \frac{\left(-1 + \frac{2}{x}\right)}{\sqrt{1 - \frac{1}{x} + \frac{2}{x^2} + 1}}$ .

Puis calculer  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x^2 - x + 2} - x$ .

b/ En déduire que la droite  $\Delta$  d'équation :  $y = \frac{1}{2}x - \frac{1}{2}$  est une asymptote de  $C_f$  au voisinage de  $(+\infty)$ .



### Exercice n°2 : (8 pts)

Etant donné un quadrilatère  $ABCD$ . On se propose de déterminer l'ensemble  $\Delta$  des points  $M$  du plan vérifiant la propriété:  $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MC} = \overrightarrow{MB} \cdot \overrightarrow{MD}$ .

On désigne par  $I$  et  $J$  les milieux respectifs des diagonales  $[AC]$  et  $[BD]$ .

1) Montrer l'équivalence:

$$(M \in \Delta) \text{ si, et seulement si } (MI^2 - MJ^2 = AI^2 - BJ^2).$$

2) En déduire l'ensemble  $\Delta$  dans chacun des cas suivants :

a/  $ABCD$  est un rectangle.

b/  $ABCD$  est un parallélogramme non rectangle.

3) Dans cette question,  $ABCD$  n'est pas un parallélogramme, soit  $O$  le milieu de  $[IJ]$ .

a/ Montrer que, pour tout point  $M$  du plan, on a :  $MI^2 - MJ^2 = 2\overrightarrow{IJ} \cdot \overrightarrow{OH}$ , où  $H$  est le projeté orthogonal de  $M$  sur  $(IJ)$ .

b/ On pose  $k = AI^2 - BJ^2$ , déduire de ce qui précède que :

$$(M \in \Delta) \text{ si, et seulement si } (OH = \frac{|k|}{2IJ}).$$

c/ Montrer alors que  $\Delta$  est une droite perpendiculaire à  $(IJ)$ .

4)  $ABCD$  est toujours n'est pas un parallélogramme, et on suppose en outre que les sommets  $A, B, C$  et  $D$  sont situés sur un cercle  $\mathcal{C}$  de centre  $\Omega$  et de rayon  $R$  et que  $(AC)$  et  $(BD)$  se coupent en  $E$ .

a/ Montrer que :  $\overrightarrow{EA} \cdot \overrightarrow{EC} = \overrightarrow{EA'} \cdot \overrightarrow{EA'}$ , où  $A'$  est le point diamétralement opposé à  $A$  sur  $\mathcal{C}$ .

b/ En déduire que :  $\overrightarrow{EA} \cdot \overrightarrow{EC} = \Omega E^2 - R^2$ .

c/ Montrer que :  $E \in \Delta$ , puis construire  $\Delta$ .

### Exercice n°3 : (4 pts)

Dans le plan orienté dans le sens direct, on considère un triangle  $ABC$  isocèle de sommet principale  $A$  tel que


$$(\widehat{BC, BA}) \equiv \theta[2\pi]. \text{ où } \theta \text{ est un réel.}$$

On construit à l'extérieur du triangle  $ABC$  les carrés  $ACDE$  et  $CBFG$ .

a/ Exprimer, en fonction de  $\theta$ , les mesures de chacun des angles orientés  $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC})$  et  $(\overrightarrow{GF}, \overrightarrow{EA})$ .

b/ Montrer que :  $2(\widehat{BE, BA}) \equiv -\frac{\pi}{2} + 2\theta[2\pi]$ .

c/ Montrer que les droites  $(BE)$  et  $(CF)$  sont parallèles.



*Bonne chance*

